大切な家畜を口蹄疫から守るために

毎日の備えと見つけた時の行動の手引き

口蹄疫の発生予防・早期発見のために、次のポイントに気をつけましょう

ポイント1 農場に出入りする車や持ち込む器具などは、農場内に入る時も出る時も必ず消毒しましょう。

ポイント2 関係者以外は農場へ立ち入らせないようにしましょう。

ポイント3 家畜の健康観察は毎日丁寧に行いましょう。

ポイント4 『食欲がない』、『動きがおかしい』など、いつもと違う状態がみられた場合には、かかりつけの獣医に相談しましょう。

佐賀県
http://www.pref.saga.lg.jp/

口蹄疫の症状（写真提供：宮崎県）

牛

症状のポイント

- 発熱がある
- 食欲が減退している（乳用牛については、乳量の減少）
- 多量のよだれ
- 口内、蹄部、鼻など皮膚の柔らかい部位の水ぶくれ
- 足を引きずる
- 口内や舌のまわりがただれている
- 複数の家畜にこのような症状がみられる



口内の水ぶくれ（初期の症状）

多量のよだれ

口内の水ぶくれ

更に詳しい口蹄疫の情報は、

動物衛生研究所のホームページ

でもご確認いただけます。

動物衛生研究所　検索

http://niah.naro.affrc.go.jp/disease/FMD/index.html

口蹄疫を疑う症状を見つけた時は、

すぐに**かかりつけの獣医**に連絡し、併せて、
最寄りの**家畜保健衛生所**にも連絡してください。

☐ かかりつけの獣医に連絡　☐ 家畜保健衛生所に連絡

連絡後は家畜保健衛生所の指示に従ってください。
（診療した獣医を含め、農場にいる関係者は、その農場から動かないでください。）

確実な検査結果が出るまでは、

☐ 口蹄疫を疑う症状が見られたら、すべての動物を畜舎から動かさないでください。

☐ 飼養場所の排水口は、適切な消毒を実施するまで閉鎖してください。

☐ 農場への人や物の出入を制限してください。

☐ 農場の入口を１箇所に限定し、入口に消毒装置を、畜舎入口には踏込み消毒槽を設置し、消毒の徹底を行ってください。（＊）

☐ 口蹄疫を疑う症状が現れた家畜の乳・糞・敷料などは、他の家畜や人、物と接触しないように覆いをするなどの措置をとってください。

☐ 急病などのやむを得ない場合以外は外出しないでください。

（＊）消毒薬の作成方法は裏面をご覧ください。

農場外へ出る時（家族を含む）

☐ 靴や衣服を替える　☐ 車両や身に着けているものを消毒　☐ 薬用石鹸で手を洗う

☐ 他の畜産関係者との接触は避ける　☐ 他の農場には立ち入らない

口蹄疫ウイルスに対して効果がある市販の消毒薬

分　類	製剤名	効果が認められた最高希釈倍数
ヨウ素系消毒薬	クリンナップA 動物用イソジン ファインホール ポリアップ16 リンドレス	４００ １ ４００ ２，０００ １，０００
塩素系消毒薬	アンテックビルコンS クレンテ スミクロール	２，０００ ２，０００ １，０００
アルデヒド系消毒薬	グルタクリーン	８００
その他	クリアキル-100 （0.1%NaOH 添加） アリバンド	２，０００ ４００

【参考】１０Ｌの消毒液を作成する場合の希釈方法・・・・・・

希釈倍数	水道水	消毒薬	備　考
４００倍	１０Ｌ	２５ｍｌ	消毒薬のキャップは約６～８ｍｌ入りますので、計量時の目安にしてください。
８００倍	１０Ｌ	１２．５ｍｌ	
１，０００倍	１０Ｌ	１０ｍｌ	
２，０００倍	１０Ｌ	５ｍｌ	

・消毒液の希釈は、必要量にあわせて行ってください。
・最高希釈倍率については、使用目的にあわせ添付の取扱説明書の濃度を参考にしてください。

お問い合わせ・相談窓口

●病気の発生に関する電話相談・問い合わせ（土・日・祝日を含む２４時間対応）

中部家畜保健衛生所　TEL 0952-31-2211
北部家畜保健衛生所　TEL 0955-82-3841
西部家畜保健衛生所　TEL 0954-22-3185

●口蹄疫対策全般に関する相談・問い合わせ（月～金曜日　9:00 ～ 17:00）（祝日除く）

佐賀県生産振興部　畜産課　TEL：0952-25-7122　FAX：0952-25-7309

佐賀県ホームページ・・・・・・・・・ 佐賀県　口蹄疫　検索
農林水産省ホームページ・・・・・ 農林水産省　検索

口蹄疫に関する情報を『防災ネットあんあん』で配信中です

『防災ネットあんあん』は、携帯電話にメールで防災・安全・安心情報を配信しています。
口蹄疫の情報を、最も早く正確に"緊急情報"でお知らせしていますのでご登録ください。

右記ＱＲコードからアクセスし、「緊急情報」を選択してください。
詳しくは、県ホームページでご覧ください。